

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 9 ЛЕТ


*кафедра фтизиопульмонологии
УО “Витебский государственный медицинский университет”,
г. Витебск*

Туберкулез известен с глубокой древности. Несмотря на повсеместно проводимую работу по борьбе с этим заболеванием и совершенствование методов диагностики и лечения, эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире остается весьма напряженной. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике Беларусь, несмотря на значительную тенденцию к улучшению, остается напряженной и в настоящее время. Противотуберкулезная служба Витебской области осуществляет работу по реализации комплексных мероприятий, направленных на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу: активно ведется работа по реализации Государственной программы «Туберкулез» на 2010-2014 годы, программы международной технической помощи «Внедрение Стратегии СТОП-ТБ в Беларуси», в частности направленной на борьбу с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и комплексного плана по борьбе с распространением мультирезистентного туберкулеза на 2012-2015 г.г., принятого на Республиканском координационном совете по туберкулезу при Совете Министров Республики Беларусь.

Основные показатели работы противотуберкулезной службы в Витебской области за последние пять лет.

Как показывает анализ данных за период 2006 – 2014г.г., усовершенствование противотуберкулезных мероприятий, проводимых в Витебской области в последние годы, способствует улучшению основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Так, за анализируемый девятилетний период отмечается постепенное неуклонное снижение показателя заболеваемости с 45,3 случаев на 100 тыс. населения в 2006г. до 32,9 случаев на 100 тыс. населения в 2014г. Таким образом, заболеваемость снизилась на 27,4% (диагр. 1).


Диаграмма 1. Динамика заболеваемости туберкулезом населения Витебской области за 2006 – 2014г.г.



Наиболее быстрый темп снижения заболеваемости туберкулезом отмечался в 2006 – 2010г.г., когда снижение данного показателя составило 16,7%. В последующем темпы снижения заболеваемости несколько замедлились и составили 10,7%. Данное замедление, наиболее вероятно, связано с постепенным изменением структуры популяции микобактерий туберкулеза, циркулирующих на территории Беларуси, характеризующееся постепенным накоплением микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью.

Еще одним важнейшим показателем, характеризующим эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, является показатель смертности. В 2014г. от туберкулеза в Витебской области умерло 56 человек, соответственно показатель смертности от туберкулеза составила 4,7 случая на 100 тыс. населения. По сравнению с 2006г. (диагр.2) произошло снижение данного показателя на 50,1% (с 9,3 в 2006г. до 4,7 – в 2014г.). Среди умерших от туберкулеза в 2014г. неработающих было 19 человек (33,3%), инвалидов – 33 человека (57,9%), пенсионеров – 5 человек (8,8%).

Диаграмма 2. Смертность от туберкулеза населения Витебской области за 2006 – 2014г.г.



Такому значительному снижению показателя смертности от туберкулеза в области, особенно в 2007 – 2010г.г., способствовало, в первую очередь, расширение использования принудительного лечения. В 2007г. количество коек для принудительного лечения в области было увеличено с 50 (в 2006г.) до 80. Также существенно увеличилось число пациентов, пролеченных на таких койках. Если в 2006г. таких пациентов было 206, то в 2010г. их число увеличилось до 284 человек. Дальнейшее снижение смертности в 2012 – 2013г.г обусловлено внедрением унифицированных методик лечения туберкулеза - Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.08.2012г. №939 «Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм».

Основной проблемой стоящей перед туберкулезной службой области является высокий уровень множественной лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным средствам. Анализ случаев заболевания туберкулезом по данным регистра «Туберкулез» показывает, что в Витебской области отмечается тенденция к снижению числа больных, выявленных с МЛУ-ТБ среди новых случаев с 34,5% в 2013 году до 32,1% в 2014 году (по РБ 33,8%) или на 2,4%. Но остается высоким уровень МЛУ-ТБ среди ранее леченных 81,8% (2013г. – 72,2%), в тоже время абсолютное число рецидивов туберкулеза уменьшилось с 77 в 2013 году до 67 в 2014 году. Показатель заболеваемости с учетом рецидивов по области за 2014 год составил 38,4 (РБ – 41,2) на 100 т.н. и уменьшился на 8,9% по сравнению с 2013 годом.

Таким образом, анализ складывающейся эпидемиологической ситуации в Витебской области показывает постепенное улучшение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу благодаря противотубер-

кулезным мероприятиям, проводимым на основе республиканских нормативных документов. Однако остаются проблемы, требующие проведения дополнительных мероприятий. В основном, это касается вопросов борьбы с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза.